

SAMENVATTING.

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende beschrijvingen en hypothesen over het ontstaan van de chondrodermatitis nodularis chronica helicis. In het tweede hoofdstuk volgt dan de histologie van de eigen gevallen. Het derde hoofdstuk behandelt de circulatieverhoudingen van het bovenste gedeelte van het oor en er wordt op gewezen dat er hier geen arterio-veneuze anastomosen voorkomen zoals ze zo gemakkelijk in de vinger- en teentoppen te vinden zijn. Een verband met een eventuele glomustumor is dan ook niet gevonden.

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan een beschouwing over de pathogenese van de chondrodermatitis. Op grond van het histologisch onderzoek van 27 eigen gevallen van chondrodermatitis, wordt dan als begin van deze afwijking een hyaliene degeneratie van het weefsel tussen kraakbeen en epidermis aangegeven.

Aangenomen wordt, dat hier door een abnormaal vaatverloop met een circulatiestoornis, door verschillende oorzaken, de degeneratie optreedt.

Bij patienten lijdende aan chondrodermatitis nodularis chronica helicis wordt een nader onderzoek naar de circulatie-verhoudingen in het bovenste gedeelte van het oor noodzakelijk geacht.